



# Sekator® Plus (Sekator® OD + Atlantis® OD)

## Sekator® OD

106 g/l Amidosulfuron  
25 g/l Iodosulfuron als Methyl-Ester  
250 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

Formulierung: OD (Ölige Dispersion)

## Atlantis® OD

10 g/l Mesosulfuron-Methy  
2 g/l Iodosulfuron-Methylester-Na  
30 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

Formulierung: OD (Ölige Dispersion)

Vor Gebrauch unbedingt die Angaben auf den jeweiligen Einzelpackungen beachten.

**Herbizid-Kombination zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern in Winterweich- und -hartweizen, Triticale und Sommerhartweizen**

Vorsicht Pflanzenschutzmittel!

Diese Pflanzenschutzmittel sind gegen Sachkundenachweis erhältlich.

Artikel-nummer	Produkt	Gebinde-größe	Geb. je Verkaufs-einheit	Geb. je Palette	Pfl.Reg.Nr. Österreich
81739412	Sekator Plus	2,6 l	2	180	
	Sekator OD	0,6 l			3372
	Atlantis OD	2 x 1 l			3253
81766592	Sekator Plus	13 l	1	48	
	Sekator OD	3 l			3372
	Atlantis OD	2 x 5 l			3253

Die registrierten Indikationen, Anwendungsbedingungen, Auflagen, Wirkungsweise und Wirkungsspektrum, sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen und Kennzeichnung finden Sie bei den Einzelprodukten Sekator OD und Atlantis OD.

## Wirkungsweise und -spektrum

**Sekator PLUS** ist ein Kombipack aus Sekator OD mit Atlantis OD für 4 bzw. 20 ha Winterweich- bzw. -hartweizen bzw. Sommerhartweizen sowie Wintertriticale.

**Sekator OD** ist ein Breitbandherbizid gegen aufgelaufene Unkräuter, das in Winter- und Sommergerste, Winterweich- bzw. -hartweizen, Sommerhartweizen, Triticale und Dinkel zugelassen ist.

**Atlantis OD** ist in Winterhart- und -weichweizen, Sommerhartweizen, Winterroggen und -triticale zugelassen. NICHT in Gerste anwenden! Atlantis OD ist ein Gräserherbizid, das je nach Aufwandmenge u. a. über eine starke Wirkung gegen Windhalm, Rispen- Arten, Raygräser, Ackerfuchsschwanz, Flughafer und einige Unkräuter verfügt.

Beide Herbizide sind wuchsstofffrei. Dadurch besteht keine Gefahr durch thermische Abdrift, was die Anwendung in Wein- und Obstbaustreulagen, neben Rübe, Sonnenblume u. a. erleichtert. Sie wirken auch zuverlässig bei kühler Witterung mit leichter Nachtfrostgefahr, sofern aktives Unkrautwachstum gegeben ist.

Die Anwendung speziell beim Ackerfuchsschwanz und beim Raygras soll im zeitigen Frühjahr rund 14 Tage nach Vegetationsbeginn erfolgen und ist bis max. 2-Knotenstadium von Winterweizen und -triticale zugelassen.

Eine zeitige Ausschaltung der Wasser-, Nährstoff- und Standortkonkurrenz durch die Unkräuter und Ungräser wird empfohlen.

## Wirkungsspektrum:

PRODUKT		Sekator PLUS
Anwendungszeit Getreide EC		13 - 32
Unkräuter	Ackerdistel (aufgelaufen)	
	Ackerwinde	
	Ackersteinsame	
	Ackerstiefmütterchen	
	Ampfer (Samen auflaufend)	
	Ehrenpreis	
	Hohlzahn (Gemeiner)	
	Kamille (Echte)	
	Klatschmohn	
	Klettenlabkraut	
	Knöterich (Winden-)	
	Kornblume	
	Melde, Gänsefuß	
	Pfeilkresse	
	Raps/A-Senf/Hederich	
	Besenrauke	
	Sonnenblume	
	Taubnessel	
	Vogelmiere	
Ungräser	Windhalm	0,5 L Atlantis
	Rispe	0,5 L Atlantis
	Raygräser	1 L Atlantis
	Ackerfuchsschwanz	1 L Atlantis
	Flughafer	0,75 L Atlantis

## Anwendungshinweise/Praxisempfehlung

Gegen **Windhalm, Rispe, Flughafer und Unkräuter** mit **0,15 L Sekator OD + 0,5 L Atlantis OD**

Gegen **Ackerfuchsschwanz und Raygräser** mit **0,15 L Sekator OD + 1,0 L Atlantis OD** rund **10 - 14 Tage nach Vegetationsbeginn im Frühjahr**

in 200 – 400 l Wasser/ha spritzen.

### Gewässerabstand:

Sekator OD 1 m

Atlantis OD 1 m

### Spezielle Anwendungshinweise:

Eine feintropfige Ausbringung verbessert die Benetzung und Wirkung. Sofort nach der Anwendung wird eine gründliche Spritzgerätereinigung empfohlen.

Nach der Ernte des behandelten Getreides können nach bisherigen Erfahrungen im Rahmen der Fruchtfolge alle Kulturen nachgebaut werden. Folgt nach Anwendung im Getreide eine extreme Trockenheit (weniger als 100 mm bodenwirksamer Niederschlag zwischen der Herbizidanwendung und der Aussaat von Raps oder Zwischenfrüchten), sind aufgrund des verlangsamten Wirkstoffabbaus Schäden an nachgebaute Zwischenfrüchten oder Winterraps möglich. Auch auf biologisch wenig aktiven Böden ist der Wirkstoffabbau verlangsamt. Unter diesen Bedingungen bzw. bei später Unkrautbekämpfung im Getreide und zeitiger Saat der Zwischenfrucht wird eine wendende Bodenbearbeitung in einer Tiefe von mind. 15-20 cm empfohlen. Die zusätzlichen Informationen am Etikett sind zu beachten.

## Mischbarkeit

Sekator PLUS ist mit Wuchsreglern wie CCC, Blattdüngern, Insektiziden oder Fungiziden mischbar, sofern Anwendungstermin und -bedingungen übereinstimmen.

Bei einer Tankmischung mit Artist bei starkem Besatz mit blühendem Ehrenpreis bzw. Taubnessel darf kein Fungizid oder Insektizid mehr beigemischt werden.

Prinzipiell wird keine Tankmischung mit mehr als 3 Mischpartnern empfohlen.

#### Mischtabelle Windhalm und Unkräuter

Behandlungsfläche in ha	Menge Sekator <sup>®</sup>	Menge Atlantis <sup>®</sup>
2	0,30 L	1,0 L
3	0,45 L	1,5 L
5	0,75 L	2,5 L
7	1,05 L	3,5 L
9	1,35 L	4,5 L
11	1,65 L	5,5 L
13	1,95 L	6,5 L
15	2,25 L	7,5 L
17	2,55 L	8,5 L
20	3,00 L	10,0 L

#### Spezielle Anwendungshinweise:

Die zusätzlichen Informationen am Etikett sind zu beachten.

## Erste-Hilfe-Maßnahmen/Hinweise für den Arzt

siehe Einzelpackungen

## Lagerung

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern. Vor dem Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Für Folgen unsachgemäßer Lagerung haften wir nicht.

® ist eine registrierte Marke von Bayer

Internetausgabe, Stand: 07.02.2025